

**FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 03/2016**

**AVISO Nº 07 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS**

O Diretor Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, o que segue:

- 1. Das respostas aos recursos administrativos sobre questões contestadas do gabarito preliminar das provas objetivas.**

CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 04 – Gabarito mantido

A partícula “que” retoma um termo ou expressão antecedente na linha 2, mais especificamente em “uma doença que”.

Questão 06 – Gabarito mantido

Apenas a alternativa II apresenta a correta classificação do verbo em destaque, bem como o aspecto verbal.

Questão 10 – Gabarito mantido

O enunciado da questão atenta apenas para a pontuação dos excertos. A pontuação está correta apenas na alternativa A, a despeito da “consecutio temporum”. As demais alternativas apresentam erros que ferem as regras de emprego de sinais de pontuação.

LEGISLAÇÃO

Questão 13 – Gabarito mantido

O art. 5º, L, da Lei Maior, prevê expressamente a alternativa B como a que está em acordo ao texto constitucional.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 30 – Gabarito mantido

A proposição composta “João não é pediatra e Maria não é dentista” é a única falsa apresentada na questão referida. Uma proposição composta com uma conjunção “e” resulta no valor lógico verdadeiro se, e somente se, ambas as proposições simples são verdadeiras. Caso contrário, a proposição composta será falsa. Ora, como “João não é pediatra” é falso e “Maria não é dentista” é verdadeiro, temos que, na proposição enunciada na alternativa E, o valor lógico final será FALSO, basta observar a tabela-verdade deste conectivo:

Tabela-verdade:

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Logo, a alternativa E é a resposta para o enunciado da questão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR

MÉDICO ANESTESISTA PLANTONISTA 12H - 24H

Questão 40 – Gabarito mantido

As alterações eletrocardiográficas da HIPOpotassemia incluem depressão do segmento ST, achatamento da onda T, aparecimento de onda U e predisposição a arritmias atriais, ventriculares e bloqueio atrioventricular. O alargamento do intervalo QRS é alteração clínica da HIPERpotassemia.

Landesberg G, Hillel Z. Electrocardiography, Perioperative Ischemia, and Myocardial Infarction. In: Miller's Anesthesia, 8th Ed, Elsevier, Philadelphia, 2014.

Menezes MS. Equilíbrio e reposição hidreletrolíticos. In: Manica J. Anestesiologia: Princípios e Técnicas, 3ª Edição, Porto Alegre, Artes Médicas, 2004.

Prough DS, Funston JS, Svensén CH, Wolf SW. Fluids, electrolytes, and acid-base physiology. In: Barash P. Clinical Anesthesia, 6th Ed, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, 2009.

“Potassium. Hyperkalemia leads to a distinctive sequence of ECG changes, starting with a narrowing and peaking of the T wave and a shortening of QT interval. Progressive hyperkalemia causes QRS widening, low P-wave amplitude, and PR interval prolongation with the possibility of second- to third-degree AV block (Fig. 47-8). Severe hyperkalemia leads to a sine-wave ventricular flutter and eventual asystole. Hypokalemia, in contrast, may cause ST-segment depression, flattened T waves, and prominent U waves, which may sometimes exceed the amplitude of T waves. Hypokalemia prolongs repolarization and leads to long QT(U) syndrome predisposing to a torsades de pointes-type ventricular fibrillation.”

Extraído de: Landesberg G, Hillel Z. Electrocardiography, Perioperative Ischemia, and Myocardial Infarction. In: Miller's Anesthesia, 8th Ed, Elsevier, Philadelphia, 2014.

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO

Questão 32 – Gabarito alterado

A sentença I, apesar de basear-se na grande frequência de ferimentos contaminados que chegam a emergência e são suturados, o termo “sempre” torna esta afirmativa incorreta.

Questão 35 – Gabarito anulado

A primeira sentença apresenta alteração de posicionamento dos termos “apenas” e “prata”...leia-se “sulfadiazina de prata apenas de maneira aberta.” Estes termos são de conhecimento dos candidatos de modo que a nítida troca de palavras não traria prejuízo ao entendimento da sentença em questão. A afirmação é incorreta, pois considera a realização de curativos com sulfadiazina de prata APENAS de maneira aberta, quando curativos abertos ou fechados com este fármaco podem ser realizados. Porém, como a alteração de grafia suscitou dúvida.

Questão 37 – Gabarito mantido

A afirmativa III está incorreta, pois o grau de contaminação e extensão do deslucamento são pertinentes a cada caso específico e desta maneira devem ser examinados e avaliados. A avaliação da viabilidade dos tecidos envolvidos (espessura, sangramento de bordos, base do retalho), debridamento e limpeza copiosa do ferimento são importantes na orientação da conduta que pode ser inclusive o reposicionamento do retalho deslucado. Outra possibilidade está relacionada na afirmativa I, onde a drenagem cirúrgica do deslucamento fechado reduz a frequência de necrose do retalho, não sendo necessário o “debridamento na sua totalidade”. A referência abordada para questionar esta afirmativa é verdadeira (Cirurgia Reparadora de Tronco e Membros refere-se ao uso de enxertia IMEDIATA da pele deslucada, quando foi sugerido na afirmativa III, “posterior enxertia cutânea quando em condições.”

MÉDICO DERMATOLOGISTA

Questão 37 – Gabarito mantido

A alternativa I está correta, pois pacientes que apresentam síndrome dos ovários policísticos, hiperandrogenismo, hipercortisolismo e puberdade precoce têm alterações hormonais que contribuem para o desenvolvimento de uma acne mais resistente ao tratamento padrão e que tende a melhorar com o tratamento da doença de base. A alternativa II está correta, pois a acne neonatal é transitória e benigna, surge em bebês com cerca de 2 semanas, tende a regredir espontaneamente, portanto o tratamento pode ser expectante, mas casos mais persistentes ou mais extensos podem ser tratados com peróxido de benzoila manipulado a 2,5% (não há produto comercial nesta concentração). A alternativa III está incorreta, pois a isotretinoína é teratogênica.

Questão 38 – Gabarito mantido

O líquen amiloidótico é a forma mais comum de amiloidose cutânea primária. A gota é uma doença metabólica na qual a anormalidade de base é a hiperuricemia. As porfirias são distúrbios metabólicos relacionados à biossíntese do heme e os sintomas cutâneos envolvem exclusivamente as áreas do corpo expostas ao sol, essa alternativa está correta, pois as porfirinas precisam ser fotoativadas para que ocorra a produção de espécies reativas de oxigênio, que provocarão a formação de bolhas, cicatrizes, perda de pigmentação e hipertricose. No Kwashiorkor as crianças afetadas apresentam uma desnutrição proteica que leva ao edema por hipoalbuminemia.

MÉDICO ENDOSCOPISTA DIGESTIVO

Questão 40 – Gabarito anulado

A questão apresenta mais de uma alternativa passível de estar correta.

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

Questão 31 – Gabarito alterado

Houve erro material de digitação do gabarito preliminar.

Questão 34 – Gabarito alterado

Houve erro material de digitação do gabarito preliminar.

Questão 38 – Gabarito alterado

Houve erro material de digitação do gabarito preliminar.

MÉDICO TRAUMATOLOGISTA

Questão 38 – Gabarito anulado

A questão apresenta mais de uma alternativa passível de estar correta.

MÉDICO TRAUMATOLOGISTA PLANTONISTA -12H - 24H

Questão 38 – Gabarito anulado

A questão apresenta mais de uma alternativa passível de estar correta.

Município de Sapucaia do Sul / RS, 19 de Abril de 2016.

**Juarez Wolf Verba
Diretor Geral
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV**