

**FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV
MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ / RS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 05/2018**

**AVISO Nº 09 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS**

O Diretor Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, o que segue:

**1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS DO
GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS**

CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01 – Gabarito mantido.

Apenas a alternativa E está correta quanto à concordância. Nas demais alternativas, há que atentar para erros decorrentes de: a) verbos impessoais e b) sujeito anteposto ao verbo.

Questão 04 – Gabarito mantido.

A questão refere-se a ideias apresentadas no texto e não a opiniões pessoais.

Questão 07 – Gabarito mantido.

Apenas as alternativas II e III estão corretas. Para chegar a tal conclusão, há que se considerar: na alternativa I, o verbo conjugado indevidamente no indicativo; na alternativa IV, o uso indevido do conetivo.

LEGISLAÇÃO

Questão 11 – Gabarito mantido.

A questão está em conformidade com o art. 29 da Constituição Federal.

Questão 16 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com as disposições da Lei nº 9.782/1999.

Questão 17 – Gabarito mantido.

O caput do art. 19 do Estatuto do Idoso torna obrigatória a notificação da autoridade sanitária e não uma faculdade, tornando incorreta a assertiva do item III da questão. O item IV está incorreto por haver expressa vedação legal de exigência de comparecimento de idoso enfermo perante órgãos públicos (Lei nº 10.741/2003, art. 15, §5º). O item I possui previsão no art. 3º, §1º, inc. VIII da Lei nº 10.741/2003, enquanto que o item II possui previsão no art. 15, §7º da Lei nº 10.741/2003.

Questão 20 – Gabarito mantido.

A questão está em conformidade com o enunciado e, especialmente, com as disposições do art. 12 da Constituição Federal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Questão 22 – Gabarito mantido.

O gabarito preliminar já apresenta a alternativa E como resposta da questão. Conforme a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (Lei nº. 7.498, de 25 de junho de 1986), bibliografia presente no edital do concurso, a identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico é atividade privativa do Enfermeiro Obstétrico.

Questão 25 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com o Calendário Vacinal (BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações: Calendário Vacinal. Brasília: Ministério da Saúde, 2017), onde está disposto que dos 10 aos 19 anos é indicado o reforço da vacina Meningocócica C ou dose única conforme situação vacinal.

Questão 26 – Gabarito mantido.

Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, bibliografia presente no edital do concurso, no capítulo 26 – Manejo de Clientes com Arritmias e Problemas de Condução verifica-se que para um ECG padrão de 12 derivações, 10 eletrodos (seis no tórax e quatro nos membros) são colocados sobre o corpo.

Questão 27 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, bibliografia presente no edital do concurso, no capítulo 26 – Manejo de Clientes com Arritmias e Problemas de Condução.

O mesmo tipo de dispositivo, denominado desfibrilador, é utilizado para a cardioversão e para a desfibrilação.

Quando se utilizam pás, o condutor apropriado é aplicado entre as pás e a pele do cliente.

O gel de ultrassom não pode substituir o gel condutor.

Ninguém deve estar em contato com o cliente ou com qualquer coisa que esteja tocando o cliente quando o desfibrilador é descarregado, para minimizar a chance de que a corrente elétrica seja conduzida até outra pessoa além do cliente.

Diversos estudos demonstraram que a desfibrilação inicial realizada por pessoas leigas em um ambiente comunitário pode aumentar a taxa de sobrevivência.

Além disso, o manual do Advanced Cardiology Life Support (2015) dispõe:

“Não utilize géis ou pastas que não sejam especificamente fabricados para desfibrilação (p. ex. el de ultrassom)”.

Questão 31 – Gabarito mantido.

A questão está conforme BARROS, E.; TORRIANI M.S.; SANTOS, L.; ECHER, I.C. Medicamentos de A a Z - Enfermagem 2016-2018. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016 – bibliografia presente no edital do concurso – e contempla o conteúdo programático: Procedimentos de Enfermagem à criança e ao adulto: administração de medicações e acesso venoso periférico, também presente no edital.

200mg – 1ml

350mg – 1,75ml

1ml – 20gts

1,75ml – 35 gotas

Questão 32 – Gabarito mantido.

Conforme BARROS, E.; TORRIANI M.S.; SANTOS, L.; ECHER, I.C. Medicamentos de A a Z - Enfermagem 2016-2018. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016 – bibliografia presente no edital do concurso – a região ventroglútea ou de Hochstetter é indicada para intramuscular e não para administração SUBCUTÂNEA como é o caso da insulina.

Questão 35 – Gabarito mantido.

Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, bibliografia deste edital e o Guidelines de Atualização do Manual da AHA para atendimento do Parada Cardiopulmonar (2015):

“O uso combinado de vasopressina e epinefrina não oferece nenhuma vantagem em comparação ao uso da dose padrão de epinefrina em PCR. Além disso, a vasopressina não oferece nenhuma vantagem sobre o uso isolado de epinefrina. Portanto, para simplificar o algoritmo, a vasopressina foi removida na Atualização de 2015 do Algoritmo de PCR em adultos. Entretanto, esteroides podem conferir algum benefício quando administrados junto com vasopressina e epinefrina no tratamento da PCR/H. Embora não se recomende o uso rotineiro de acordo os estudos de acompanhamento, seria razoável o profissional administrar o conjunto em PCR/H.” Portanto, a vasopressina ainda é utilizada em PCR.

Questão 37 – Gabarito anulado.

Houve erro material de digitação no enunciado da questão, o qual deveria solicitar a alternativa correta.

Questão 38 – Gabarito mantido.

Conforme BRASIL. Ministério da Saúde. HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de Atenção Básica, n. 18) (Série A. Normas e Manuais Técnicos – bibliografia presente no edital do concurso: recomenda-se lavagem exaustiva com água e sabão em caso de exposição percutânea.

Após exposições em mucosas, é recomendado a lavagem exaustiva com água ou soro fisiológico a 0,9%. As exposições cutâneas, que se caracterizam pelo contato com pele com dermatite ou feridas abertas ou mordeduras com presença de sangue, devem ser avaliadas tanto para o indivíduo que provocou a lesão quanto para aquele que tenha sido lesado.

Não existe nenhuma medida específica eficaz para redução do risco de transmissão do vírus da hepatite C após exposição ocupacional.

Questão 39 – Gabarito mantido.

Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, – bibliografia presente no edital do concurso – no capítulo 23 – Manejo de Clientes com Distúrbios do Tórax e das Vias Aéreas Inferiores tem-se que: “utiliza-se o método de Mantoux para determinar se uma pessoa foi infectada com o bacilo da tuberculose. O método é amplamente utilizado na triagem para infecção latente por M. tuberculosis.”

Questão 40 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com o Protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde, encontrado na bibliografia do edital do concurso em: Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Brasília: Ministério da Saúde, 2013 e citada no enunciado da questão. A bibliografia dispõe que: sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos não devem ser utilizados concomitantemente; a higienização simples das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos (portanto, a duração mínima é de 40 segundos, e não de um minuto); fricção das mãos com preparação alcoólica antisséptica deve ter duração de no mínimo 20 a 30 segundos; a fricção das mãos com preparação alcoólica contendo um agente umectante agride menos a pele do que a higiene com sabonete líquido e água; as indicações para higiene das mãos contemplam higienizar as mãos com sabonete líquido e água quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais ou após uso do banheiro.

Sabão e sabonete são utilizados para a limpeza/higienização/asseio, estando os termos em conformidade com o contexto em que foram empregados, não ocasionando nenhum prejuízo na interpretação da assertiva.

Sendo assim, a única alternativa que responde corretamente à questão é a letra E.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA

Questão 25 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a Lista de Verificação do Protocolo de Cirurgia Segura do Ministério da Saúde – bibliografia presente no edital do concurso: Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

Questão 28 – Gabarito mantido.

A questão está conforme ROTHROCK, J. C. A. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007 – bibliografia presente no edital do concurso: no final do procedimento, os

materiais não podem ser todos reunidos de forma desorganizada para posterior separação no centro de materiais esterilizados;

a mesa de instrumentação é chamada de Mesa de Mayo; não se deve usar soro fisiológico, pois o sal pode corroer instrumentos e o instrumento deve ser colocado preferencialmente diretamente sobre a palma da mão do cirurgião. A única alternativa correta para a questão é a letra C.

Questão 38 – Gabarito anulado.

Não há alternativa passível de ser considerada correta.

TÉCNICO DE RADIOLOGIA

Questão 24 – Gabarito mantido.

A questão refere-se a exceções às regras e está de acordo com BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 – página 33: “um estudo da pelve exige apenas uma incidência AP simples, a menos que haja suspeita de fratura de osso do quadril”. Estando dentro de uma exceção à regra, a resposta correta é a letra E.

Questão 30 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a bibliografia disposta no edital do concurso: BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 (página 169), em que as patologias demonstradas são: fraturas ocultas da cabeça e/ou colo do rádio.

Questão 33 – Gabarito mantido.

Nas estruturas mostradas oblíquas anteriores se visualiza forames vertebrais e pedículos no lado do paciente mais perto do RI e nas estrutura mostradas oblíquas posteriores se visualiza forames vertebrais e pedículos no lado do paciente mais distante do RI. Sendo assim, conforme o enunciado, a questão trata-se das estruturas mostradas oblíquas posteriores. Logo, realiza-se angulação cefálica de 15° para C4.

Questão 34 – Gabarito mantido.

Desenvolvidos para uso clínico na década de 1950, os aparelhos de cobalto 60 foram utilizados na maioria das vezes para tratamentos por feixe externo. Esses aparelhos utilizam o cobalto 60, uma fonte radioativa que emite raios gama, com energia média de 1,25 MeV, para administrar a radioterapia (BONTRAGER, 2010).

Refere-se à definição, introdução e irradiação por feixe externo. A Radiação Gama trata-se de uma fonte usada para tratamentos oncológicos, ou seja, tratamentos radioterápicos. O enunciado expõe claramente que o uso dos raios são para uso clínico, através dos aparelhos de cobalto 60 utilizados na maioria das vezes para tratamentos por feixe externo. Além disso, a fonte citada no recurso não consta no edital do concurso.

Questão 39 – Gabarito mantido.

Somente a Proctografia Evacuativa demonstra todas as patologias de retoceles, intussuscepção retal e prolapso do reto citadas no enunciado. A intussuscepção pode ser visualizada no estudo de Enema com contraste único ou ar/gás, porém, descartam-se as demais patologias que são descritas no enunciado. O Enema Baritado não visualiza todas as patologias. Logo, a única alternativa correta é a letra A.

MÉDICO AUDITOR

Questão 27 – Gabarito alterado para D.

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

Médico Cirurgião Geral Rotineiro

Questão 40 – Gabarito alterado para D.

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

MÉDICO CLÍNICO ROTINEIRO

Questão 32 – Gabarito alterado para D.

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

MÉDICO DO TRABALHO

Questão 36 – Gabarito alterado para D.

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

MÉDICO INFECTOLOGISTA

Questão 37 – Gabarito alterado para D.

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

MÉDICO RADIOLOGISTA

Questão 23 – Gabarito alterado para D.

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

Questão 35 – Gabarito alterado para A.

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

Município de Tramandaí / RS, 09 de Abril de 2018.

**Gilberto Barichello
Diretor Geral
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV**